**PRESCRIPTION
& CONCILIATION**

WEBINAIRE
CERTIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS DE
SANTÉ POUR LA QUALITÉ DES SOINS (V2020)

Prise en charge médicamenteuse

PLAN

- Rappels généraux sur le Référentiel de Certification
- Les éléments essentiels des points Clés PRESCRIPTION :
 - Prescription informatisée
 - Prescription manuscrite
 - Habilitations
 - Prescriptions particulières
 - Prescriptions à hauts risques
 - Support unique de prescription d'administration
- Les éléments essentiels du point Clé CONCILIATION – Critère avancé

LE RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

- Liens utiles :

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2969340/fr/decouvrir-la-nouvelle-certification

https://www.has-sante.fr/jcms/r_1495044/fr/mettre-en-oeuvre-la-certification-pour-la-qualite-des-soins

Chapitres sont déclinés en plusieurs objectifs, déclinés en plusieurs critères

Référentiel

Le manuel

Fiches critères

Fiches pratiques

Certification des établissements de santé pour

la qualité des soins :

15 objectifs

3 CHAPITRES
15 OBJECTIFS
17 CRITÈRES IMPÉRATIFS

1. Le patient est informé et son implication est recherchée
2. Le patient est respecté
3. Les proches et/ou aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec l'accord du patient
4. Les conditions de vie et de lien social du patient sont prises en compte dans le cadre de sa prise en charge
5. La pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée au sein de l'équipe
6. Les équipes sont coordonnées pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire tout au long de sa prise en charge
7. Les équipes maîtrisent les risques liés à leurs pratiques
8. Les équipes évaluent leurs pratiques notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patientèle
9. L'établissement définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire
10. L'établissement favorise l'engagement des patients individuellement et collectivement
11. La gouvernance fait preuve de leadership
12. L'établissement favorise le travail en équipe et le développement des compétences
13. Les professionnels sont impliqués dans une démarche de qualité de vie au travail impulsée par la gouvernance
14. L'établissement dispose d'une réponse adaptée et opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté
15. L'établissement développe une dynamique d'amélioration continue de la qualité des soins

CHAPITRE 1 : LE PATIENT

4 objectifs

Le patient est informé et son implication est recherchée

Le patient est respecté

Les proches et/ou aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec l'accord du patient

Les conditions de vie et de lien social du patient sont prises en compte dans le cadre de sa prise en charge

CHAPITRE 2 : LES ÉQUIPES DE SOINS

4 objectifs

La pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée et partagée avec le patient

Les équipes sont coordonnées pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire tout au long de sa prise en charge

Les équipes maîtrisent les risques liés à leurs pratiques

Les équipes évaluent leurs pratiques notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patientèle

CHAPITRE 3 : L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

7 objectifs

L'établissement définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire

L'établissement favorise l'engagement des patients individuellement et collectivement

La gouvernance fait preuve de leadership

L'établissement favorise le travail en équipe et le développement des compétences

Les professionnels sont impliqués dans une démarche de qualité de vie au travail (QVT) impulsée par la gouvernance

L'établissement dispose d'une réponse adaptée et opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté

L'établissement développe une dynamique d'amélioration continue de la qualité des soins

I. Le patient

1. Est informé et son implication est recherchée Critères PECM
2. Est respecté Critères PECM
3. Ses proches et/ou aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec son accord
4. Ses conditions de vie et de lien social sont prises en compte dans le cadre de sa prise en charge

II. L'équipe

5. La pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée en son sein Critères PECM
6. Est coordonnée pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire Critères PECM
7. Maîtrise les risques liés à ses pratiques Critères PECM
8. Évalue ses pratiques notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patiente Critères PECM

III. L'établissement

9. Définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire
10. Favorise l'engagement des patients individuellement et collectivement
11. Sa gouvernance fait preuve de leadership
12. Favorise le travail en équipe et le développement des compétences
13. Les professionnels sont impliqués dans une démarche de qualité de vie au travail impulsée par la gouvernance
14. Dispose d'une réponse adaptée et opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté
15. Développe une dynamique d'amélioration continue de la qualité des soins Critères PECM

BOÎTE À OUTILS DE LA HAS

LA FICHE PÉDAGOGIQUE SUR LA PECM

Dédiée à l'évaluation de la prise en charge médicamenteuse et rappelle :

- ✓ Les enjeux nationaux
- ✓ En quoi la certification répond à ces enjeux
- ✓ Les points clés nécessitant une attention particulière des experts-visiteurs pendant la visite

Évaluation de la prise en charge médicamenteuse
selon le référentiel de certification

La prise en charge médicamenteuse est un processus complexe qui repose sur l'organisation du circuit du médicament. Celle-ci doit prendre en compte dans sa mise en œuvre les facteurs humains et organisationnels, les facteurs environnementaux, l'évaluation des pratiques professionnelles et les situations à risque.

Plusieurs facteurs expliquent la survenue d'erreurs :

- l'intervention de différents acteurs de santé dont les rôles particuliers sont complémentaires et l'enchaînement de nombreuses étapes qui se réalisent en des lieux géographiquement différents ;
- la diversité des pathologies, leur degré d'urgence et de gravité couplée à la diversité des thérapeutiques et des terrains des patients ;
- des projets thérapeutiques de plus en plus complexes nécessitant un développement d'information adapté au patient d'autant plus délicate ;
- la circulation d'une information qui n'est d'ailleurs pas toujours accessible ;
- ou encore l'interruption de tâches.

L'objectif de la prise en charge médicamenteuse à l'hôpital est d'assurer au bon patient l'apport du bon médicament, à la bonne posologie, selon la bonne voie, dans les bonnes conditions et au meilleur coût.

Outils de sécurisation et d'auto-évaluation de l'administration des médicaments HAS, 2013

- Enjeux nationaux**
- Lutter contre l'iatrogénie médicamenteuse.
 - Éviter les erreurs médicamenteuses.
 - Sécuriser les médicaments à risque.
 - Promouvoir le bon usage des antibiotiques et lutter contre l'antibiorésistance.
 - Promouvoir la conciliation des traitements médicamenteux.
 - Développer la culture de la pertinence des prescriptions médicamenteuses.
- Principales données actuelles**
- Les EIG liés aux médicaments représentent 32,9% du total des EIG liés aux soins¹. Parmi les EIG liés aux médicaments :
 - 51,2% sont considérées comme évitables ;
 - 54,5% ont motivé une hospitalisation.
 - Une part notable des (ré)hospitalisations est évitable, notamment celles fréquentes liées à des problèmes médicamenteux (iatrogénie, problèmes d'observance et sous traitement) : entre 20 et 30% des prescriptions ne sont pas pertinentes.²

¹ Enquête nationale ENEIS sur les événements indésirables graves (EIG) liés aux soins, réalisée en 2009.
² Stratégie nationale de santé 2018-2020.

Un mémo utile pour les experts visiteurs et les établissements

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/fiche_pedagogique_pec_medicamenteuse.pdf

HAS
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Évaluation de l'hospitalisation à domicile selon le référentiel de certification

→ L'hospitalisation à Domicile (HAD) est un mode d'hospitalisation à part entière, dont les objectifs sont de :

- mettre en place et coordonner au domicile du patient l'intervention de multiples professionnels, salariés ou libéraux, autour du projet thérapeutique du patient, décliné en un projet de soins personnalisé du patient ;
- garantir la continuité des soins au domicile.

→ L'HAD permet d'assurer, au domicile du patient, des **soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés** qui se différencient des autres soins à domicile par la complexité et la fréquence des actes et permet également aux patients d'éviter, de retarder ou de raccourcir une hospitalisation avec hébergement.

→ L'HAD concerne des patients de tous âges (enfants, adolescents, adultes) atteints de pathologies graves, aiguës ou chroniques, souvent multiples, évolutives et/ou instables qui, en l'absence de prise en charge en structure d'hospitalisation à domicile, relèveraient d'une hospitalisation complète.

Enjeux nationaux

- Hôpital au plus près du patient.
- Garantir la continuité des soins au domicile.
- Inscrire les prises en charge dans des parcours de soins.
- Donner toute sa place à l'HAD dans « MA SANTÉ 2022 ».

Principales données actuelles (ATIH, données 2018/FNEHAD)

- 122000 patients hospitalisés en HAD.
- 147 établissements exerçant uniquement une activité d'HAD.
- 288 établissements d'HAD en France.

En quoi la certification répond aux enjeux du thème ?

Pilotage

- Réaliser et partager une analyse des transferts en HAD avec les services prescripteurs et les HAD (2.3-04).

Actions

- Rechercher l'implication du patient et de ses proches (1.1-13, 1.3-02).
- Coordonner les équipes de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire et s'assurer de la continuité des soins tout au long de la prise en charge du patient (2.2-13, 2.2-14).
- Maîtriser les risques liés aux pratiques spécifiques à l'HAD (2.3-05).

Évaluation

- Analyser et exploiter les indicateurs qualitatifs dont les IQSS (coordination de la prise en charge en HAD), (3.7-03).

HAS
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Évaluation de la douleur et des soins palliatifs selon le référentiel de certification

La douleur est un symptôme. Elle doit être soulagée rapidement. L'évaluation de la douleur et toutes décisions de prise en charge sont tracées et renseignées. La douleur du patient doit être systématiquement recherchée et c'est elle qui fait foi.

Les soins palliatifs sont considérés comme une prise en charge. Ils cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille face aux conséquences d'une maladie potentiellement mortelle par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. Ce sont des soins actifs, continus, évolutifs, coordonnés et pratiqués par une équipe pluriprofessionnelle. Ils procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal.

La démarche de soins palliatifs vise à éviter les investigations et les traitements déraisonnables tout en refusant de provoquer intentionnellement la mort.

La loi n° 2016-87 du 2 février 2016 relative aux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie dispose, que : « Le médecin met en place l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir effet d'abrèger la vie. Il doit en informer le malade, sans préjudice du quatrième alinéa de l'article L.1111-2, la personne de confiance prévue à l'article L.1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches du malade. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.

Enjeux nationaux

- Rendre le patient acteur dans sa prise en charge de la douleur.
- Développer les compétences spécifiques des professionnels.
- Avoir recours à des expertises ou avis spécialisés.
- Renforcer la prise en charge de la douleur en fin de vie.
- Impliquer l'entourage du patient.
- Favoriser l'élaboration des projets de soins en incluant toute les équipes de soins et les professionnels de soins de support, dans les situations de fin de vie.
- Développer les compétences spécifiques des professionnels en soins palliatifs.

Éléments clés

Douleur : véritable enjeu de santé publique depuis 1995

- Facteur d'efficacité pour faciliter la guérison des patients.
- Principe n°2 de la charte de la personne hospitalisée.
- 87% : Indicateur IPAQSS campagne 2019.
- 235 structures « douleur chronique » (SDC) pour 227 000 patients traités par an (DGOS 2017).

HAS
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Évaluation de la prise en charge des personnes âgées selon le référentiel de certification

Les personnes âgées constituent une population :

- spécifique** en raison de la survenue fréquente de polyopathologies, et, pour les plus âgées d'entre elles, de prévalence augmentée de fragilité physique, psychique ou socio-économique et d'un risque de perte d'autonomie et de dépendance. (source HAS) ;
- hétérogène**, plus souvent hospitalisée, pour une durée plus longue et en passant plus fréquemment par le service des urgences.

Enjeux nationaux

- Développement de la coordination et animation du lien Ville/Hôpital.
- Fluidification des parcours et facilitation des admissions directes.
- Limitation des passages aux urgences.
- Renforcement de la formation pour une meilleure prise en charge des personnes âgées.
- Meilleure intégration de la prévention de la dépendance dans les pratiques.
- Optimisation de la continuité des soins à la sortie : lutte contre la rupture des parcours et réduction des ré-hospitalisations évitables.

Principales données actuelles (Rapport de l'atelier 10 Hôpital et personne âgée - 2018)

- Géronto-croissance : en 2030, 1 personne sur 3 aura plus de 60 ans, assortie d'une augmentation de la perte d'autonomie chez le sujet âgé.
- Fragilités fonctionnelles, sociales et psychologiques.
- Les personnes âgées représentent 29% des séjours hospitaliers du secteur du court séjour, 40% de l'HAD et 50% des SSR.
- 45% des passages aux urgences de personnes âgées sont suivis d'une hospitalisation.
- Plus de 30% d'hospitalisations potentiellement évitables et 18% de réadmissions non programmées à J30.
- 60% de décès à l'hôpital :
 - hospitalisation plus fréquentes et durées moyennes de séjour prolongées,
 - allongement du temps de passages aux urgences,
 - perte d'autonomie liée à l'hospitalisation de l'ordre de 30 à 60%.

En quoi la certification répond aux enjeux de la thématique ?

Pilotage

- Adapter et développer une offre de soins en lien avec les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux pour les parcours des patients du territoire et participer aux projets territoriaux de parcours (3.1-01).
- Participer à la coordination des parcours sur le territoire ou extra territoire dans le cas d'activités de recours (3.1-04).
- Fluidifier les parcours : prévenir les passages évitables des personnes âgées aux urgences générales, limiter le temps de passage et favoriser les hospitalisations directes (3.1-07).
- Promouvoir la prévention et la détection de la maltraitance ordinaire au sein de l'établissement (3.2-06).

HAS
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Évaluation de la prévention des infections associées aux soins selon le référentiel de certification

→ Une infection est dite associée aux soins (IAS) si elle survient au cours ou au décours d'une prise en charge diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative, et si elle n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge. On parle d'infection nosocomiale lorsque l'IAS a été contractée à l'hôpital.

→ Le malade peut s'infecter avec ses propres micro-organismes, à la faveur d'un acte invasif et/ou en raison d'une fragilité particulière.

→ Les micro-organismes peuvent aussi avoir pour origine les autres malades (transmission croisée), les personnels ou la contamination de l'environnement hospitalier.

Enjeux nationaux

- Surveiller les infections associées aux soins.
- Développer leur prévention en ciblant les infections les plus fréquentes et les plus graves.
- Réduire les risques infectieux associés aux actes de chirurgie et de médecine interventionnelle.
- Réduire les infections associées aux dispositifs invasifs.
- Renforcer la prévention et la maîtrise de l'antibiorésistance.
- Assurer la promotion de la vaccination des professionnels de santé.

Principales données actuelles

- Les IAS concernent 5% des patients hospitalisés soit 470 000 cas/an.
- Les IAS les plus courantes sont :
 - Infections urinaires ;
 - Infections du site opératoire ;
 - pneumonies ;
 - bactériémies.
- C'est la troisième cause d'événement indésirable grave.
- 20 à 30% des IAS sont évitables.
- Elles entraînent :
 - des durées d'hospitalisation prolongées ;
 - des réinterventions chirurgicales ;
 - 3000 à 4000 décès/an.
 - Les risques augmentent avec l'âge du patient, son terrain, et la nature des actes pratiqués : un patient porteur d'un dispositif invasif a un risque d'être infecté multiplié par 4,61.
 - 25 millions de cathéters veineux /an sont posés aux patients en France.
 - Faible taux de couverture des personnels de santé pour les vaccins recommandés (grippe < 40%).

[HAS, Fiche pédagogique – Evaluation de la prise en charge des personnes âgées selon le référentiel de certification, Septembre 2020](#)

[HAS, Fiche pédagogique – Evaluation de la prévention des infections associées aux soins selon le référentiel de certification, Novembre 2020](#)

[HAS, Fiche pédagogique – Evaluation de la douleur et des soins palliatifs selon le référentiel de certification, Décembre 2020](#)

[HAS, Fiche pédagogique – Evaluation des secteurs interventionnels selon le référentiel de certification, Novembre 2020](#)

RAPPEL SUR LES CRITÈRES

Standards :

Attendus de la certification

Impératifs :

Ce que l'on ne veut plus voir dans les établissements

Si une évaluation de l'un de ces critères est négative, la HAS se réserve le droit de ne pas accorder la certification

Avancés :

Exigences souhaitées mais non exigibles à ce jour

17 CRITÈRES IMPÉRATIFS

→ Ce qu'on ne veut plus voir au sein d'un établissement de santé
→ Si une évaluation de l'un de ces critères est négative, la HAS se réserve le droit de ne pas accorder la certification de l'établissement

- Pour un critère impératif, si l'évaluation n'atteint pas le niveau d'exigence attendu, une « fiche anomalie » est rédigée.
- Elle caractérise la nature de l'anomalie et en détermine les causes. Sont appréciés :
 - l'impact sur le patient,
 - les pratiques habituelles,
 - la connaissance de l'établissement de cette situation,
 - l'intégration dans la gestion de ses risques,
 - et les éventuelles mesures conservatoires mises en œuvre ou projetées.

Cet argumentaire, partagé avec l'établissement, a vocation à éclairer la prise de décision de la commission de certification.

LA FICHE PECM

LA
PRESCRIPTION

Fiche pédagogique sur la PECM : Points Clés : LA PRESCRIPTION

Fiche pédagogique sur la PECM :

La PRESCRIPTION

La prescription représente l'étape initiale du circuit du médicament ; étape importante sous la responsabilité médicale et de certaines catégories professionnelles.

Vous devez vous assurer que :

- toute prescription soit rédigée sur un support informatique ou papier et validée par le prescripteur (signature manuscrite ou électronique) ;
- l'identité et la signature manuscrite ou électronique soient identifiables.
- le niveau d'habilitation des prescripteurs soit vérifié et suivi par la Direction de l'établissement.

Vous observerez le niveau de déploiement de l'informatisation de la prescription dans l'établissement et notamment les interfaces entre les services informatisés et les services non informatisés pour la prescription (souvent source de dysfonctionnements).

Vous porterez une attention spécifique sur :

- les prescriptions dites « particulières » : prescription anticipée, prescription « si besoin », prescription orale (cette dernière devant être exceptionnelle) ;
- les prescriptions considérées à risques : en fonction de l'âge ; en fonction du médicament lui-même et en fonction du type de prescriptions.

L'analyse portant sur l'intégralité de la prescription, il sera important de vérifier que celle-ci intègre donc tout médicament pris par le patient durant son hospitalisation y compris son traitement personnel.

Vous vous assurerez que le support de prescription est toujours lié au support d'administration (support unique). **Vous interrogerez** les équipes sur leur participation à des audits et/ou des évaluations de pratiques professionnelles (EPP) concernant les prescriptions. **Vous apprécierez** l'appropriation par les professionnels des résultats des évaluations.

1. La prescription médicamenteuse

La prescription des médicaments

- Prescription informatisée
- Prescription manuscrite
- Habilitations
- Prescriptions particulières
- Prescriptions à hauts risques
- Support unique de prescription d'administration

PRESCRIPTION : CRITÈRE ET ÉLÉMENTS D'ÉVALUATION

Critère 1.1-09 : le patient, en prévision de sa sortie, est informé des consignes de pour les médicaments qui lui sont prescrits

CRITERE STANDARD

Le patient traceur

Éléments d'évaluation

Patient traceur

Professionnels

- Les professionnels s'assurent du bon niveau de compréhension du patient.

Patient

- Le patient, en prévision de sa sortie, est informé :
 - des éventuelles modifications de son traitement habituel (arrêt, substitution, posologie, etc.);
 - de l'éventuel nouveau traitement prescrit;
 - des consignes de suivi;
 - de la nécessité de signaler tout effet indésirable lié à son traitement médicamenteux et selon les modalités indiquées.

PRESCRIPTION : CRITÈRE ET ÉLÉMENTS D'ÉVALUATION

Critère 2.3-03 : les équipes respectent les bonnes pratiques de prescription et de dispensation des médicaments

CRITERE STANDARD

Le parcours traceur

Le traceur ciblé

Éléments d'évaluation

Parcours Traceur		Traceur ciblé	
Professionnels	Consultation documentaire	Professionnels	Gouvernance
<ul style="list-style-type: none"> Le bilan thérapeutique est présent dans le dossier du patient (lettre de liaison ou document de transfert entre deux services). 	<ul style="list-style-type: none"> Dans le cas d'une non-utilisation du dossier informatisé pharmaceutique, la prescription mentionne clairement l'identification et la signature du prescripteur, la date et l'heure, la dénomination des molécules en DCI, la posologie, la durée du traitement. 	<ul style="list-style-type: none"> Le bilan thérapeutique est présent dans le dossier du patient (lettre de liaison ou document de transfert entre deux services). 	<ul style="list-style-type: none"> L'analyse pharmaceutique est organisée et pertinente et intègre les informations du dossier pharmaceutique s'il existe, et les interventions pharmaceutiques sont prises en compte.

FICHE PÉDAGOGIQUE SUR LA PECM : LES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

Zoom sur les prescriptions particulières

On retrouve des prescriptions particulières :

Prescription de protocole anticipé

- La rédaction est pluriprofessionnelle.
- Elle doit être datée et signée par un médecin, revue annuellement, diffusée à l'ensemble des professionnels; Elle est tracée dans le dossier de soins infirmiers.
- C'est une prescription qui peut être appliquée à un ou plusieurs patients.

Paracétamol 1g

si température > 38.5°
maximum, 3 prises par 24 h,
pendant maximum 3 jours

Prescription conditionnelle : « si besoin »

- Pour cette prescription, les conditions d'administration sont clairement établies : nombre maximal d'administrations par période de 24 heures accompagné d'un intervalle temporel entre deux prises consécutives, durée maximale de traitement. Cette prescription est revue annuellement.

La prescription conditionnelle ne s'applique qu'à un patient.

Prescription orale : (interdite sauf de façon exceptionnelle en situation d'urgence)

- L'administration sur prescription orale majore le risque d'incompréhension, d'oublis et d'erreurs.
- Elle ne doit être acceptée qu'exceptionnellement, devant une situation d'urgence dans l'attente de l'arrivée imminente du prescripteur.
- Cette situation sous-entend l'existence obligatoire de protocoles d'urgence validés par le responsable médical de structure. Hormis ce cas, toute prescription orale est interdite, la responsabilité de l'infirmier(e) étant alors entièrement engagée.
- La prescription orale doit être écrite et contresignée par le médecin le plus tôt possible.

FICHE PÉDAGOGIQUE SUR LA PECM : LA PRESCRIPTION

Zoom sur les prescriptions à haut risque

Pour certaines populations - Enfant, personne âgée

Exemples chez l'enfant : la dose de médicaments est adaptée à son poids. La plupart des médicaments utilisés en pédiatrie sont présentés et conditionnés pour les adultes.

- Il est donc nécessaire de fractionner les doses de médicaments disponibles, de préparer la dose à administrer à un volume ou à une concentration calculée à partir d'un dosage réservé à l'adulte. Ces opérations préalables présentent un risque majeur pour le professionnel comme pour le patient. Une attention particulière doit leur être apportée.

Exemples pour des médicaments inappropriés chez la personne âgée

- Il est nécessaire d'intégrer en amont de la prescription les capacités de déglutition de la personne âgée.
- Il faut privilégier la prescription de formes galéniques adéquates (Formes liquides : solutions, gouttes, sirop, suspension...).
- Ainsi que la gestion de l'autonomie de la prise des médicaments.

Pour certains types de médicaments - Stupéfiants, chimiothérapie, ...

- Prescription des stupéfiants : conditions de prescription réglementaire : prescripteur habilité, prescription nominative, ordonnance sécurisée, indication en toutes lettres du nombre d'unités thérapeutiques par prise, du nombre de prise, du dosage, de la durée, attention durée limitée de prescription suivant les formes de morphiniques.

Selon le type de prescriptions : entrée, sortie, ambulatoire, ...

Afin d'assurer la continuité médicamenteuse

- À l'entrée : le traitement personnel complet du patient, mis en place antérieurement à son hospitalisation, doit être pris en compte, validé par un médecin et prescrit en fonction de l'état clinique du patient et de son motif d'hospitalisation.
- À la sortie : le traitement de sortie du patient doit être rédigé dans la lettre de liaison.
- Pour les patients « vulnérables » un tableau comparatif des traitements de l'entrée et de la sortie doit être formalisé et expliqué au patient et à son entourage.

➤ Focus sur une population à risque : PECM de la Personne Agée

- [Guide « Qualité de la prise en charge médicamenteuse en EHPAD »](#) - Outil collaboration ARS & OMEDIT HDF
- [Outils d'optimisation thérapeutique](#) : Lien vers les modules OPPA - Coopération Omedits Bretagne- Normandie - HDF

- Outils de détection des **prescriptions potentiellement inappropriées** chez la personne âgée : Liens vers outils pertinents

[Liste de Laroche](#), [Outil en ligne Stopp Start](#), [STOPP/START- V.2](#), [Outil MedEHPAD](#)

LES OUTILS DISPONIBLES

➤ Focus sur une population à risque : PECM de la Personne Âgée

DES CLÉS POUR BIEN PRESCRIRE CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE CONNAÎTRE LES RECOMMANDATIONS DES SOCIÉTÉS SAVANTES

Guide P.A.P.A: Prescriptions médicamenteuses Adaptées aux Personnes Âgées

The screenshot shows the website of the Conseil National Professionnel de Gériatrie (CNP). The header includes the CNP logo and navigation links: ACCUEIL, LE CNP, LE MÉTIER DE GÉRIATRE, DPC, FORMATIONS, AGENDA, and ACTUALITÉS. The main content area features a large banner for 'LE GUIDE PAPA'. Below the banner is a thumbnail of the guide's cover, which displays a grid of numbers 1 through 11 and the title 'Prescriptions médicamenteuses Adaptées aux Personnes Âgées - LE GUIDE P.A.P.A.'. The cover also lists the directors: Olivier Hanon and Claude Jeandel. Logos for the Société Française de Gériatrie et de Geriatrie (SFGG) and the CNP are visible at the bottom of the cover.

La Société Française de Gériatrie et Geriatrie (SFGG) le Conseil National Professionnel de gériatrie (CNP) et La Société Française de Gériatrie et Geriatrie (SFGG) ont pris l'initiative de concevoir un guide regroupant 42 fiches de « bonne prescription médicamenteuse » adaptées aux personnes âgées de 75 ans et plus quel que soit leur lieu de vie (domicile, EHPAD...) destiné au corps médical, et plus particulièrement des gériatres et des médecins coordonnateurs d'EHPAD mais aussi aux pharmaciens.

Les personnes âgées se voient prescrire en moyenne 7 molécules différentes correspondant à 7 affections, au moins trois fois par an. Par ailleurs, la iatrogénie et le défaut d'observance médicamenteux représentent un des 4 facteurs d'hospitalisation dite évitable. Devant ce constat, la SFGG et le CNP de gériatrie publient un guide des bonnes pratiques relatives à 42 maladies ou situations fréquemment rencontrées (déshydratation, insomnie, dépression, douleur, etc.) dans toutes les spécialités.

C'est leur adéquation et leur adaptation aux personnes âgées de plus de 75 ans qui en font toute l'originalité et toute l'utilité.

Comment se procurer le Guide Papa ?

Au prix de 14€ (version papier) et 10€ (version ebook), il est disponible en commande sur le site de l'éditeur Editions Frison Roche ici ainsi que sur Amazon (et sur commande en librairie).

Appli en Ligne et Smartphone medEHPAD

medEHPAD						
Sommaire		Circuit du médicament		Boîte à outils		
<ul style="list-style-type: none"> + MEDIC. A VISEE ANTALGIQUE ET ANTIPYRETIQUE + MEDIC. A VISEE ANTIDIABETIQUE + MEDIC. A VISEE ANTI-INFECTIEUSE + MEDIC. A VISEE ANTI-INFLAMMATOIRE + MEDIC. A VISEE ANTINEOPLASIQUE ET IMMUNOMODULAT + MEDIC. A VISEE BUCCALE, NASALE ET OTOLOGIQUE + MEDIC. A VISEE CARDIOVASCULAIRE + MEDIC. A VISEE DERMATOLOGIQUE + MEDIC. A VISEE GASTRO-ENTEROLOGIQUE + MEDIC. A VISEE GENITO-URINAIRE ET HORMONES SEXUEL + MEDIC. A VISEE NEUROLOGIQUE + MEDIC. A VISEE OPHTALMOLOGIQUE + MEDIC. A VISEE PSYCHIATRIQUE + MEDIC. A VISEE RHUMATOLOGIQUE + MEDIC. VISANT LE SANG ET LES ORGANES HEMATOPOIET + MEDIC. AGISSANT SUR LE SYSTEME RESPIRATOIRE ET A + MEDIC. A VISEE THYROIDIENNE + VITAMINES ET MINERAUX 						
Nom/DCI	Modalité de préparation	Modalité d'administration	Alternative galénique	Remarque	Adapt à la fonction rénale	
ANTIPSYCHOTIQUES				Remarques et posologie standard adaptée au sujet âgé	Adaptation à la fonction rénale	
CLOZAPINE cp. 25 et 100 mg (LEPONEX)			Non	<ul style="list-style-type: none"> o Utilisé dans la psychose chez le sujet parkinsonien o Prescription initiale hospitalière. o Bilan hématologique obligatoire avant l'instauration du traitement et tous les mois (Risque d'agranulocytose). o Bilan cardiaque (ECG) avant l'instauration. 	●	
HALOPÉRIDOL cp. 1 et 5 mg (HALDOL)			Haloperidol sol. Bu. 2mg/ml fl. 15 et 195ml (HALDOL sol. buv.) Haloperidol injectable 5mg/1ml	<ul style="list-style-type: none"> o Pas plus de 2mg par jour chez le sujet âgé, uniquement en dernier recours en cas d'échec aux autres traitements (pharmacologique et non pharmacologique). o Risque de sédation et d'hypotension orthostatique. o Augmentation de la mortalité chez le sujet âgé dément 	●	
LITHIUM cp. 250 mg et cp. LP 400 mg (TERALITH)			Non	<ul style="list-style-type: none"> o Administrer au cours d'un repas o La posologie doit être individualisée pour chaque malade selon les concentrations sanguines et la réponse clinique. o La lithiémie minimale efficace recommandée est de 0,5 à 0,8 mEq/litre. 	● Contre indication absolue	
LOXAPINE cp. 25, 50 et 100 mg (LOXAPAC)			LOXAPAC sol. buv. 25 mg/ml fl. 30 et 60 ml	<ul style="list-style-type: none"> o Chez le sujet âgé, posologie entre 37,5 et 100mg/j. o Attention, risque de sédation et d'hypotension orthostatique. 	● Précaution d'emploi en cas d'insuffisance rénale chronique	
OLANZAPINE cp. 5, 7,5 et 10 mg (ZYPREXA)			Forme orodisp. 5, 10, 15 et 20 mg ZYPREXA VELOTAB	<ul style="list-style-type: none"> o Une dose de 5mg/j doit être envisagée chez le sujet âgé de plus de 65 ans. o Administrer à heure fixe. o Risque de diabète induit. 	● Risque de syndrome malin en cas d'insuffisance rénale aiguë	
RISPERIDONE cp. 1, 2 et 4 mg (RISPERDAL)			cp orodisp. 0,5 ; 1,2,3 et 4mg (RISPERDALoro et génériques) RISPERDAL sol. buv. 1mg/ml fl. 30,60,120ml	<ul style="list-style-type: none"> o Indiqué dans la schizophrénie, les accès maniaques et l'agressivité persistante chez le patient présentant une démence d'Alzheimer modérée à sévère : une posologie initiale de 0,25mg deux fois par jour est recommandée. o Assurer une hydratation suffisante. o Risque d'AVC et d'accidents ischémiques. o Attention à l'association au Furosémide : mortalité plus élevée chez le sujet dément 	● ● indépendamment de l'indication, les posologies initiale et d'entretien doivent être divisées par deux	
TIAPRIDE cp. 100 mg (TIAPRIDAL et génériques)			Tiapridal 5mg/goutte fl. 30 ml	<ul style="list-style-type: none"> o Chez le sujet âgé, le traitement sera instauré à dose faible, 50mg 2 fois par jour, la posologie de 200 à 300mg/ jour sera atteinte progressivement. o ECG conseillé avant l'instauration pour mesurer l'espace QT. 	● Si 11

LES OUTILS DISPONIBLES

➤ Focus sur une population à risque : le patient pédiatrique

- [lien outil HUG](#) : Guide d'aide à la prescription, la dispensation et l'administration en PÉDIATRIE
- [Outil SwissPedDose](#)

➤ Autres Outils : DCI, Biosimilaires, Médicaments à risques

[E-learning BIOSIMILAIRES](#) - Omedit HDF

[Evaluation de la pertinence des prescriptions de KCl injectable hypertonique : Grilles d'audit et son guide d'accompagnement pour évaluer les pratiques](#) – Omedit BRETAGNE

LES OUTILS DISPONIBLES

➤ Autres Outils : Prescription DM

- Pansements et soins des plaies : aide à la prescription de sortie
- Mémo Ameli - Pansement Plaie Chronique : ATTENTE DU KIT DEDIE CAQES avec actualisation

le mémo fait le point sur les modalités de prescription et de renouvellement du pansement primaire pour plaie chronique dans le cadre des dispositifs médicaux. Il rappelle l'importance de la coordination médecin-infirmier

- **Cahier prescription hospitalière et bonne dispensation en ville – Pansement ***

lien accès direct sur site Europharmat : <https://www.euro-pharmat.com/cahier-de-prescription-et-dispensation/25-pansements/2448-cahier-prescription-hospitaliere-et-bonne-dispensation-en-ville-pansement>

- COMPRESSION : modèle de prescription de sortie pour BAS et BANDES – Omédit Centre

EN RÉSUMÉ ...PRESCRIPTION

CRITERE
STANDARD

LES ATTENDUS

- Réalisée sur support informatique (élément de sécurisation) ou manuscrite (**retranscription non autorisée**)
- Validée par le prescripteur (identité et signature identifiables)
- Niveau d'habilitation des prescripteurs soit vérifié (**liste retrouvée à la PUI**)
- Interrogation des équipes sur leur participation à des audits et ou des évaluations des pratiques professionnelles (EPP) et appropriation des équipes des résultats des évaluations
- Analyse de l'intégralité de la prescription incluant la prise en compte du traitement personnel

VIGILANCE SPECIFIQUE

- Prescriptions dites particulières : anticipée, « si besoin » et prescription orale
- Prescriptions à haut risque : **enfants et personnes âgées, certains types de médicaments (stupéfiants, chimiothérapie etc.) et le type de prescriptions (entrée, sortie, ambulatoire etc.)**
- **Support unique** (prescription + administration)
- **Déploiement de l'informatisation de la prescription** (interfaces entre les services informatisés ou non)

Ordonnance médicale

- ✓ Nom et spécialité du prescripteur
- ✓ N° RPPS
- ✓ Identité du service
- ✓ Date et lieu
- ✓ Informations du patient : nom, prénom, sexe, DDN, poids (obligatoire pour l'enfant), surface corporelle (anticancéreux) etc.
- ✓ Liste des produits prescrits
- ✓ Prescription en DCI
- ✓ Forme galénique
- ✓ Dosage
- ✓ Posologie
- ✓ Voie d'administration
- ✓ Mode d'emploi
- ✓ Durée du traitement
- ✓ Modalités de renouvellement
- ✓ Signature du médecin prescripteur

LA FICHE PECM

LA
CONCILIATION

FICHE PÉDAGOGIQUE SUR LA PECM : LES POINTS CLÉS – LA CONCILIATION

L'objectif de la prise en charge médicamenteuse à l'hôpital est d'assurer au bon patient l'apport du bon médicament, à la bonne posologie, selon la bonne voie, dans les bonnes conditions et au meilleur coût.

Outils de sécurisation et d'auto-évaluation de l'administration des médicaments HAS, 2013

5 CRITÈRES AVANCÉS

Secteurs	Thématiques
Maternité	Les futurs parents discutent d'un projet de naissance avec l'équipe soignante dès le début de la grossesse
Tout l'établissement	La sécurité de la prise en charge médicamenteuse du patient bénéficie d'une conciliation des traitements médicamenteux Critère 2.2-07
Tout l'établissement	L'établissement mobilise les actions d'expertise des patients
Tout l'établissement	La gouvernance impulse et soutient des démarches spécifiques d'amélioration du travail en équipe
Tout l'établissement	L'accréditation des médecins et des équipes médicales est promue dans l'établissement

II LES EQUIPES DE SOIN

Critère 2.2-07 La sécurité de la prise en charge médicamenteuse du patient bénéficie d'une conciliation des traitements médicamenteux

OBJECTIF 2.2

Les équipes sont coordonnées pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire tout au long de sa prise en charge

La conciliation des traitements médicamenteux est un processus formalisé qui prend en compte, lors d'une nouvelle prescription, tous les médicaments pris et à prendre par le patient. Elle associe le patient et repose sur le partage d'informations et sur une coordination pluriprofessionnelle. Elle prévient ou corrige les erreurs médicamenteuses en favorisant la transmission d'informations complètes et exactes sur les médicaments du patient entre professionnels de santé aux points de transition : admission, sortie et transferts.

Tout l'établissement **Avancé**

Références HAS

- ⬆ Mettre en œuvre la conciliation des traitements médicamenteux en oncologie, 2019.
- ⬆ Mettre en œuvre la conciliation des traitements médicamenteux en établissement de santé, 2018.

Références légales et réglementaires

- Art. L. 5126-1-3° du CSP.
- Art. R. 6111-10 du CSP.
- Art. R. 6144-2 et R. 6164-3-1° du CSP.
- Art. R. 1112-48 du CSP.

Autres références

- Organiser l'activité de pharmacie clinique – ANAP, 2019.
- Enjeux de l'informatisation de la conciliation médicamenteuse – ANAP, 2019.

Éléments d'évaluation

Professionnels

- La conciliation médicamenteuse est mise en œuvre pour les situations les plus à risque.

Gouvernance

- L'établissement a identifié des secteurs, des situations ou des profils de patients pour lesquels il est pertinent de développer la conciliation des traitements médicamenteux.

Traceur ciblé

Méthode d'investigation

Traceur ciblé

La rencontre avec la gouvernance de l'établissement permettra à l'EV d'appréhender si l'établissement a identifié des secteurs, des situations ou des profils de patients pour lesquels il est pertinent de développer la conciliation des traitements médicamenteux (CTM).

La rencontre avec les professionnels (pharmacien, médecin...) permettra à l'EV d'appréhender :

- pourquoi et comment ont été retenus les secteurs, les situations ou les profils de patients pour lesquels l'établissement développe la conciliation des traitements médicamenteux ;
- le niveau de développement de la conciliation médicamenteuse de l'établissement ;
- les critères de priorisation pris en compte ;
- le niveau d'intégration de la conciliation au sein des équipes ;
- le type de CTM mis en place (conciliation proactive ou rétroactive).

Pour pouvoir considérer que l'établissement met en œuvre de la conciliation médicamenteuse des traitements conformément aux Bonnes Pratiques, **vous devrez retrouver** :

- **au moins 3 sources d'informations** parmi : patient, prescriptions, Dossier Pharmaceutique, officine, médecin traitant, IDE libérale ;
- **les 4 étapes de CTM avec réalité de l'échange médico-pharmaceutique** (cf. Zoom suivant) ;
- **la traçabilité des 4 étapes de la CTM dans le dossier patient.**

6. La conciliation des traitements médicamenteux

Les 4 étapes de la conciliation des traitements médicamenteux et leur traçabilité

- 1 Le recueil de l'information
- 2 La rédaction du bilan médicamenteux
- 3 La validation du bilan médicamenteux
- 4 Le partage et l'exploitation du bilan médicamenteux

Définition

La conciliation des traitements médicamenteux est un processus formalisé qui prend en compte, lors d'une nouvelle prescription, tous les médicaments pris et à prendre par le patient.

Elle associe le patient et repose sur le partage d'informations et sur une coordination pluriprofessionnelle.

Elle prévient ou corrige les erreurs médicamenteuses en favorisant la transmission d'informations complètes et exactes sur les médicaments du patient, entre professionnels de santé aux points de transition que sont l'admission, la sortie et les transferts. L'enjeu de la conciliation médicamenteuse est de sécuriser la prise en charge médicamenteuse du patient lors de son parcours de soins.

La conciliation des traitements médicamenteux (CTM) vise à prévenir un risque de survenue d'erreur médicamenteuse (EM) grâce à un partage efficace des informations complètes des traitements du patient entre les professionnels de santé à tous les points de transition, au sein ou entre les établissements de santé, les structures médico-sociales et la ville.

La conciliation est dite **proactive** lorsque le bilan médicamenteux est établi **AVANT** rédaction de la 1^{re} ordonnance à l'admission - **méthode de prévention** des erreurs médicamenteuses.

La conciliation est dite **rétroactive** lorsque le bilan médicamenteux est établi **APRÈS** rédaction de la 1^{re} ordonnance à l'admission - **méthode d'interception** des erreurs médicamenteuses.

La CTM n'est pas :

- de l'analyse pharmaceutique ;
- de la révision globale des traitements ;
- de l'éducation thérapeutique du patient ;
- RMM, REMED, CREX...

DÉFINITION DES « 2 » CONCILIATIONS

La conciliation des traitements médicamenteux qualifiée de proactive contribue à la prévention des erreurs médicamenteuses (figure 2).

- Le bilan médicamenteux est établi AVANT qu'il y ait une prescription. Le bilan communiqué au prescripteur doit être pris en compte lors de la rédaction de l'ordonnance autant que de besoin. Les changements décidés sont documentés. La traçabilité de la part du prescripteur de la prise en compte du bilan médicamenteux doit être réalisée

Figure 2. La conciliation des traitements médicamenteux proactive

La conciliation des traitements médicamenteux qualifiée de rétroactive contribue à l'interception des erreurs médicamenteuses avérées (figure 3).

- Le bilan médicamenteux est établi APRÈS la rédaction de la prescription ; le bilan sera comparé à la prescription en cours. Les éventuelles divergences repérées seront communiquées au prescripteur. Il les prendra en compte lors de la rédaction d'une nouvelle ordonnance autant que de besoin. Les changements décidés sont documentés. La traçabilité de la part du prescripteur de la prise en compte du bilan médicamenteux est réalisée.

Figure 3. La conciliation des traitements médicamenteux rétroactive

Conciliation

**CRITERE
AVANCE**

Critère 2.2-07 : la sécurité de la prise en charge médicamenteuse du patient bénéficie d'une conciliation des traitements médicamenteux

Éléments d'évaluation

Traceur ciblé

Professionnels

- La conciliation médicamenteuse est mise en oeuvre pour les situations les plus à risque.

Gouvernance

- L'établissement a identifié des secteurs, des situations ou des profils de patients pour lesquels il est pertinent de développer la conciliation des traitements médicamenteux

Bilan thérapeutique & Conciliation

Critère 2.3-08 : Les équipes maîtrisent le risque de discontinuité de la prise en charge médicamenteuse du patient vulnérable à sa sortie

CRITERE
STANDARD

Le patient
traceur

Éléments d'évaluation

Patient traceur

Professionnels

- Les équipes expliquent et fournissent au patient vulnérable un comparatif de son traitement habituel (avant son séjour) et de son traitement à la sortie (après son séjour).

Consultation documentaire

- Le bilan thérapeutique des traitements est tracé dans le dossier du patient au jour de la sortie et intégré dans la lettre de liaison.

Partageons l'information : la lettre de liaison

La lettre de liaison : une continuité des soins garantie, un partage d'informations pour les professionnels de santé et une prise en charge sécurisée pour les patients

* La synthèse médicale, inscrite dans la convention nationale des médecins de juillet 2011, est élaborée par le médecin traitant. Elle comprend les pathologies en cours, les antécédents personnels et les facteurs de risque, les traitements au long cours et les « points de vigilance ».
 ** À partir de 2016, à chaque sortie d'établissement de santé, un indicateur validera la qualité des lettres de liaison, d'abord en court séjour puis progressivement dans tous les secteurs.

But: Garantir la **sécurité** et la **continuité** de la **prise en charge** à chaque étape du parcours du patient entre la ville et l'hôpital.

La lettre de liaison place ainsi le médecin traitant au cœur de la coordination du parcours du patient. Elle est rendue **obligatoire** à compter du **1^{er} janvier 2017** par le [décret n°2016-955 du 20 juillet 2016](#) relatif aux lettres de liaison.

Elle intervient à deux temps de la prise en charge :

- **A l'entrée en hospitalisation :**
 - 1^{ère} lettre de liaison
 - rédigée par le professionnel adresseur
 - Elle doit comporter les motifs de l'hospitalisation et toute information importante à transmettre à l'établissement accueillant le patient
- **A la sortie d'hospitalisation :**
 - 2^{ème} lettre de liaison :
 - Elle reprend les informations essentielles du séjour du patient adressée le jour même au médecin traitant ou au praticien qui l'a adressé si ce n'est pas le médecin traitant
 - une copie est également remise au patient

A l'**entrée** en hospitalisation, cette lettre comprend les **éléments** suivants :

- Identification du patient, du médecin traitant ou du praticien adresseur
- Motif(s) de la demande d'hospitalisation
- Allergies connues
- Traitements en cours
- (Antécédents médicaux et chirurgicaux non obligatoires)

Les **éléments** à retrouver sur une **lettre de liaison de sortie** d'hospitalisation :

- Identification du patient, du médecin traitant ou médecin adresseur, et du médecin ayant pris en charge le patient dans l'établissement
- Dates et modalités d'entrée et de sortie d'hospitalisation
- Motif d'hospitalisation
- Synthèse médicale du séjour, s'il y a lieu : la survenue d'évènements indésirables, l'identification de micro-organismes multi-résistants ou émergents, l'administration de produits sanguins ou dérivés du sang ou encore la pose d'un dispositif médical implantable au cours de l'hospitalisation
- Traitements médicamenteux prescrits à la sortie de l'établissement (avec la posologie et la durée de traitement) et ceux arrêtés durant le séjour ainsi que le motif d'arrêt ou remplacement
- Attente de résultats d'examens ou d'autres informations complétant la lettre de liaison
- Suites à donner (actes à programmer, recommandations, surveillances particulières)

Dans les deux cas, la lettre est adressée par messagerie sécurisée ou par tout moyen garantissant la confidentialité des informations. Elle peut être ajoutée au DMP si le patient en est titulaire.

ACRONYMES EN PHARMACIE CLINIQUE

BM

BMP

PPP

EP

BPM

BMO

CM

CTM

Les actions de pharmacie clinique

Le décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur définit les actions de pharmacie clinique (art. R. 5126-10)

- **L'expertise pharmaceutique** clinique des prescriptions ;
- La réalisation de **bilans de médication** ;
- L'élaboration de **plans pharmaceutiques personnalisés** ;
- Les **entretiens pharmaceutiques** et les autres actions d'éducation thérapeutique auprès des patients ;
- L'élaboration de la stratégie thérapeutique permettant d'assurer la **pertinence et l'efficacité des prescriptions**, et d'améliorer **l'administration des médicaments**.

[Décret n° 2019-489 du 21 mai 2019](#)

SFPC. Lexique (2017). Accessible [ici](#)

ACRONYMES EN PHARMACIE CLINIQUE

Échange entre un patient et un pharmacien permettant de recueillir des informations et de renforcer les messages de conseil, de prévention et d'éducation. Un entretien pharmaceutique se décline selon des objectifs pré-définis et adaptés au patient. L'entretien peut être mis en œuvre dans le cadre d'une conciliation des traitements médicamenteux (entrée ou sortie), d'une évaluation et/ou d'un renforcement de l'adhésion thérapeutique et d'une action éducative ciblée

Liste exhaustive des médicaments pris ou à prendre par le patient, qu'ils soient prescrits par le médecin traitant ou spécialiste ou qu'ils soient pris en automédication

Projet formalisé de suivi thérapeutique individualisé proposé par le pharmacien à l'issue du bilan de médication dans le cadre d'une concertation pluri-professionnelle et négocié avec le patient, dans un souci de continuité des soins

Résultat d'une conciliation des traitements médicamenteux associée à une Expertise Pharmaceutique Clinique. Il permet d'identifier les patients ou situations à risque nécessitant un plan pharmaceutique personnalisé.

Processus formalisé qui prend en compte, lors d'une nouvelle prescription, tous les médicaments pris et à prendre par le patient. Elle associe le patient et repose sur le partage d'informations et sur une coordination pluriprofessionnelle. Elle s'appuie sur le bilan médicamenteux

LES OUTILS DISPONIBLES

- Outils de pharmacie clinique
 - Aide à la priorisation pour la conciliation des traitements médicamenteux
 - Formations Formaconcil (SFPC) – [lien](#)
 - Plaquettes d'information sur la conciliation des traitements médicamenteux (médecins, pharmaciens, patients)

C'EST QUOI ?

La conciliation des traitements médicamenteux du patient est une enquête réalisée par l'équipe pharmaceutique de l'hôpital qui permet de recueillir la liste des médicaments que vous prenez à la maison. Cela va permettre de réaliser un bilan médicamenteux avec le médecin qui s'occupe de vous pendant votre hospitalisation.

COMMENT PUIS JE AIDER À LA CONCILIATION ?

Lorsque vous voyez un professionnel de santé, communiquez-lui la liste complète de vos médicaments ainsi que vos dernières ordonnances.

Demander à votre pharmacien de faire ouvrir votre **DOSSIER PHARMACEUTIQUE !**

Il s'agit d'un dossier informatique sécurisé créé par votre pharmacien avec votre accord. Il recense les médicaments qui vous ont été délivrés au cours des 4 derniers mois, ainsi que les traitements et prises en cours.

POURQUOI ?

La conciliation a pour but de prévenir le risque d'effet indésirable médicamenteux en facilitant les transmissions d'informations entre la ville et l'hôpital.

Coordonnées de votre établissement de santé :

www.omedit-normandie.fr

LA CONCILIATION DES TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX DU PATIENT

omedit Normandie

LES OUTILS DISPONIBLES

AFFICHES

- [Pour votre sécurité, passez le relais \(affiche\)](#)
- [Affiche de sensibilisation aux erreurs médicamenteuses et diaporama personnalisable](#)

LOGIGRAMMES DE CONCILIATION:

- [Logigramme "Processus de conciliation à l'admission d'un patient"](#)
- [Logigramme "Processus de conciliation à la sortie d'un patient"](#)

COMMENT CONDUIRE UN ENTRETIEN PHARMACEUTIQUE :

- [Guide pour l'élaboration d'une stratégie de pharmacie clinique](#)

OUTILS « CONCILIATION ET HAD »

Conciliation médicamenteuse de sortie vers l'HAD (Omedit Centre)

Outils dédiés OMEDIT GRAND EST:

- [Tryptique information patient](#)
- [Protocole de mise en œuvre de la conciliation médicamenteuse en HAD](#)
- [HAD - Officine : fiche de liaison](#)
- [Fiche de recueil pour la conciliation médicamenteuse en HAD](#)
- [Fiche de synthèse pour la conciliation médicamenteuse en HAD](#)

Boîte à outils "Pharmacie clinique"

Omedit PAYS DE LOIRE

PHARMACIE CLINIQUE

Page publiée le 4 août 2021

Retrouvez
notre

Conciliation médicamenteuse

Logigramme conciliation d'entrée

[cliquez ici](#)

Logigramme conciliation de sortie

[cliquez ici](#)

Outils de sensibilisation aux erreurs médicamenteuses

[cliquez ici](#)

Évaluation et indicateurs de suivi

[cliquez ici](#)

Recommandations (guides HAS, outils SFPC...)

[cliquez ici](#)

Conciliation médicamenteuse - OMEDIT Pays de la Loire

ERreur Médicamenteuse & Sécurité des soins (ERMES) - CH de Lunéville

METTRE EN PLACE LA CONCILIATION MÉDICAMENTEUSE

Retrouvez ci-après les différents outils pour la mise en place et la pratique de la conciliation médicamenteuse :

- Recommandations
- Logigrammes
- Formation
- Information et sensibilisation
- Évaluation et indicateurs de suivi
- Enquêtes et retours d'expériences

[Vidéo REX : expérience en conciliation médicamenteuse](#)

[SFPC 2018 9 OMEDIT Pays Loire - YouTube](#)

Critère 2.2-07 : la sécurité de la prise en charge médicamenteuse du patient bénéficie d'une conciliation des traitements médicamenteux

LES ATTENDUS

- La conciliation n'est pas : de l'analyse pharmaceutique (critère 2.3-03), de la révision globale des traitements, de l'éducation thérapeutique du patient, RMM, REMED, CREX etc. (évalués dans d'autres critères spécifiques)
- Traçabilité des différentes étapes sur les supports respectifs
- Choix des secteurs, situations ou profils de patients concernés par la conciliation du traitement médicamenteux (CTM)
- Niveau de développement de l'établissement
- Critères de priorisation pris en compte
- Niveau d'intégration de la conciliation médicamenteuse au sein de l'équipe
- Type de CTM (proactive ou rétroactive)

VIGILANCE SPECIFIQUE

- Retrouver au moins **3 sources d'informations** parmi le patient, les prescriptions, le dossier pharmaceutique, le médecin traitant ou l'IDE libérale
- Les 4 étapes de la conciliation du traitement médicamenteux avec réalité de l'échange médico-pharmaceutique
- Traçabilité des 4 étapes dans le dossier patient

Les 4 étapes de la conciliation

1- Le recueil d'information

2- La rédaction du bilan
médicamenteux

3- La validation du bilan
médicamenteux

4- Le partage et
l'exploitation du bilan
médicamenteux

LES PROCHAINS WEBINAIRES THÉMATIQUES

Save the date

LA DISPENSATION, L'APPROVISIONNEMENT, TRANSPORT ET STOCKAGE

Les éléments essentiels :

- Analyse pharmaceutique des prescriptions
- Préparation éventuelle des doses à administrer
- Délivrance des médicaments
- Mise à disposition des informations et des conseils nécessaires au bon usage du médicament
- Gestion des commandes
- Transports des produits
- Règles de stockage

→ 23 Novembre 2021 à 13h en visioconférence

→ Inscription : <https://forms.office.com/r/sCHgMCcCSw>

L'ADMINISTRATION

Les éléments essentiels :

- Prescription prise en compte
- Vérification des concordances entre le produit, le patient et la prescription
- Administration par un professionnel de santé habilité
- Traçabilité dans le dossier
- Information et surveillance du patient

→ 30 Novembre 2021 à 13h en visioconférence

→ Inscription : <https://forms.office.com/r/sCHgMCcCSw>

[Foire aux questions](#)
[RésOMEDIT](#)

Liens utiles

[Site RSQR](#)

[Site OMEDIT](#)

[Site HAS](#)

REX EN HDF : REPLAY

Nouvelle certification

Réunion régionale « Retours d'expériences des établissements pilotes et enseignements des premières visites de certification »

Le 15 Octobre 2021 de 10h à 12h30 en visioconférence

Organisée par l'ARS, la SRA RSQR et FAS, en présence de la HAS

Les établissements de santé sont invités à diffuser l'information auprès de leurs professionnels soignants

LIEN REPLAY DISPONIBLE:

**JOURNÉE RÉGIONALE :
CERTIFICATION POUR LA
QUALITÉ DES SOINS**

Framaforms

Certification des établissements de santé pour la qualité des soins

Dans le cadre de la certification des établissements de santé pour la qualité des soins (HAS - Haute Autorité de Santé), nous vous invitons à nous faire part de vos questions relatives aux critères en lien avec la Prise En Charge Médicamenteuse (PECM).

Ces questions ont pour objectif d'alimenter un thésaurus des interrogations émises par les établissements. Une réponse collégiale du ResOMÉDIT, en cohérence avec le manuel de certification, sera apportée à ces dites interrogations.

Résomedit
Le réseau des OMÉDITs

Pour consultez ce thésaurus des questions, rendez-vous prochainement sur les sites des OMÉDITs :